

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----------------------|----------------|--------------------|--------------|------|---------|----------|----|------|----------|----------|----------|-------|---|--|---|---|
| 22 | 40代 | 30代 | 奥多摩ライブラリ(フィナスタリドセット) | カーボンは使用していません。 | 定期検診(3ヶ月ごと)を利用した。 | 8,001～9,000円 | 10ヶ月 | 効果を感じた。 | 副作用が現れた。 | | | 1ヶ月～3ヶ月後 | 感じなかった。 | 6～10分以内 | 良かった。 | 実際に使ってみると、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 多岐にわたる症状、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 |
| 23 | 30代 | 30代 | 奥多摩ライブラリ(フィナスタリドセット) | カーボンを使用しています。 | 毎月購入を利用した。 | 2,001～3,000円 | 6ヶ月 | 効果を感じた。 | 副作用が現れた。 | | | 3ヶ月～6ヶ月後 | 感じなかった。 | 11～15分以内 | 良かった。 | 継続して服用することで、症状が徐々に改善されてきました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 効果が徐々に現れ、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 |
| 24 | 50代 | 50代 | 手塚クリニック(フィナスタリド) | カーボンを使用していません。 | 定期検診(3ヶ月ごと)を利用した。 | 3,001～4,000円 | 8ヶ月 | 効果を感じた。 | 副作用が現れた。 | | | 6ヶ月～9ヶ月後 | 感じなかった。 | 11～15分以内 | 普通 | 継続して服用することで、症状が徐々に改善されてきました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 効果が徐々に現れ、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 |
| 25 | 40代 | 40代 | 手塚クリニック(フィナスタリド) | カーボンを使用していません。 | 定期検診(12ヶ月ごと)を利用した。 | 2,001～3,000円 | 9ヶ月 | 効果を感じた。 | 副作用が現れた。 | | 情報提供 | 3ヶ月～6ヶ月後 | 感じました。 | 11～15分以内 | 良かった。 | 継続して服用することで、症状が徐々に改善されてきました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 効果が徐々に現れ、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 |
| 26 | 30代 | 30代 | 奥多摩ライブラリ(フィナスタリドセット) | カーボンを使用していません。 | 定期検診(3ヶ月ごと)を利用した。 | 6,001～7,000円 | 1年 | 効果を感じた。 | 副作用が現れた。 | | 情報提供 | 3ヶ月～6ヶ月後 | 少し感じました。 | 6～10分以内 | 良かった。 | 継続して服用することで、症状が徐々に改善されてきました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 効果が徐々に現れ、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 |
| 27 | 30代 | 30代 | 奥多摩ライブラリ(フィナスタリドセット) | カーボンを使用していません。 | 定期検診(1ヶ月ごと)を利用した。 | 6,001～8,000円 | 6ヶ月 | 効果を感じた。 | 副作用が現れた。 | なし | 情報提供 | 3ヶ月～6ヶ月後 | 少し感じました。 | 6～10分以内 | 良かった。 | 継続して服用することで、症状が徐々に改善されてきました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 効果が徐々に現れ、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。また、定期的な検診を受けることで、病状の経過をしっかりと把握することができました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 | 継続して服用する必要があり、定期的な検診を受けることが大切です。また、処方された薬が効果的で、副作用も少ないと感じました。 |